

In Vitro

JMI Lab., North Liberty, Iowa, USA; Pfizer Inc., New York, NY, USA

Indicazioni

- Mafegia (f. g. age age ig he f. g. G 1e The d. g. f. a. ge i (f. a. ge i) i e e ing Pha e 3 c. i ca, de e. f. a. f. a. a. f. ca dide. i. a i e ca didia i (NCT05421858).
- Mafegia ha de. n. ed e in vitro acii agai. Candida. , e ce C. krusei (e a. ed Pichia kudriavzevii), Aspergillus. , a d. d. i. a e.
- Thi. d de e. n. ed he in vitro acii f. a. ge i a d ca. a. agai. a. age ca. ecio. fi. f. e. e ca. e. ed ea. a d. d. i. a e. f. a. he SENTRY S. ei, a ce P. g. a. n.

Re.

- Mafegia de. n. ed e in vitro acii agai. i f. e. e. e ca. e. ed ea. e hibi i g. e. e a ed MIC a. e. e. he. d. g. c. a. e. :
 - Candida fermentati (MIC_{50/90}, 0.008/0.06 g/L),
 - C. guilliermondii (MIC_{50/90}, 0.008/0.016 g/L),
 - C. quercitrusa (MIC, 0.016 g/L), Saprochaete clavate (f. a. Geotrichum clavatum; MIC_{50/90}, 0.03/0.06 g/L),